



ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasiliły się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Softa-Man[®]

(Ethanolum +Propanolum)
(47,90 g + 18 g)/100 ml roztwór na skórę

Skład:

100 ml roztworu na skórę zawiera:
- substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu;
- substancje pomocnicze: adypinian diizopropylowy, makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa (Flair PH 799 893/731960), alantoina, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:

Butelki zawierające 100 ml, 500 ml lub 1000 ml roztworu na skórę
Kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Softa-Man i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Softa-Man
3. Jak stosować lek Softa-Man
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Softa-Man
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Softa-Man i w jakim celu się go stosuje

Lek Softa-Man ma postać roztworu na skórę, zawiera substancje czynne - etanol i propanol, które działają bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz przeciw-wirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki.

Wskazania do stosowania:

Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

2. Zanim zastosuje się lek Softa-Man

Nie należy stosować leku Softa-Man:

- w nadwrażliwości na etanol lub propanol, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
- doustnie,
- na zranioną lub wysuszoną skórę.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Softa-Man

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk.

Nie należy stosować leku na zranioną lub zmienioną chorobowo skórę. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w preparacie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Lek jest łatwopalny. Trzymać lek z dala od ognia; nie palić papierosa w pobliżu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.

Stosowanie innych leków: Brak danych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

2009-01-22 - 87063

3. Jak stosować lek Softa-Man

Leku nie należy rozcieńczać.

Dezynfekcja skóry rąk:

Wcierać w dłoń przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man, aż do wyschnięcia skóry.

Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk:

Wcierać w dłoń i przedramiona przez 2 min 2 razy po 5 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man. Skóra musi być zwilżona lekiem przez 2 min.

Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B):

Wcierać w dłoń porcjami przez 5 min 5 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man. Skóra musi być zwilżona lekiem przez 5 min.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Softa-Man

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

W przypadku omyłkowego spożycia leku Softa-Man

W przypadku omyłkowego wypicia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może nastąpić zatrucie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Softa-Man może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości ze strony skóry, np. alergja kontaktowa. Odnotowano miejscowe podrażnienie skóry, np. swędzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stosowania. Mogą wystąpić objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Softa-Man

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 miesięcy

Lek łatwopalny.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

ADRES

Aesculap-Chifa Sp. z o.o.

Ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (061) 44 20 100

fax. (061) 44 23 936

Data opracowania ulotki: 2008-12-08

B | BRAUN

Podmiot odpowiedzialny:
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

