

# 소프트맨액(오리지널)

Softa-Man®

일반의약품

**성상** : 무색의, 투명하거나 약간 탁한 알코올함의 정성이 있는 외용액제

**함량 (주성분)** : 100g중 에탄올(96%)(E.P) 55.7g,  
프로판올(E.P) 21g

**효능·효과** : 수술시 및 위생목적의 손소독

**용법·용량** : 이 약은 희석하지 않고 원액 그대로 사용한다.

1. 수술시 수술자의 손 소독  
이 약 5ml를 손바닥에 취하여 양쪽 손과 팔(팔꿈치까지)에 골고루 묻혀준 후 3분 이상 문지르면서 건조시킨다. 이것을 2회 실시한다.

2. 위생 목적의 손 소독  
이 약 3ml를 손바닥에 취하여 양쪽 손에 골고루 묻혀준 후 30초 동안 문지르면서 건조시킨다.

## 사용상의 주의사항

### 1. 경고

- 이 약은 **인화성**이다.  
이 약은 스파크, 담뱃불, 불꽃, 기타 다른 점화 물질에 의해 불이 쉽게 붙을 수 있으므로 발화성물질로부터 멀리 보관한다. 이 약을 실수로 많은 양을 쏟았을 경우 발화성물질에 닿지 않게 특별히 주의하고, 불활성의 흡수제로 닦아내거나, 충분한 량의 물을 희석한다. 적절하게 환기시키고, 폭발의 위험이 없는지 확인한다.
- 이 약을 **삼키지 않는다**.  
이 약은 외용액이며, 삼켜서는 안 된다. 삼킨 경우 의사의 지시에 따라 즉시 응급처치를 받는다. (응급 처치 : 의사의 지시에 하에 구도를 유도함)

### 2. 다음 부위에는 투여하지 말 것.

- 혈액공급이 불충분한 부위
- 상처부위, 눈, 점막 및 궤양 부위

### 3. 이상반응

- 이 약의사용으로 인해 접촉피부염, 광과민증 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 알콜로 인한 국소 피부자극 증상(예: 가려움, 발적 특히 본 제제의 빈번한 사용 후)은 드물다.
- 습도가 낮은 계절(특히 겨울)에 드물게 피부의 건조증상이 나타날 수 있다.

### 4. 일반적 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
- 이 약은 피부에만 국소적으로 사용되므로 피부를 통한 알콜의 흡수는 소량이다.
- 경구 섭취시:  
이 약의 경구섭취가 보고된 적은 없지만, 부주의로 인한 경구섭취가 발생하면 본 제제의 알콜(에탄올, 프로판올)성분은 신속히 흡수될 것으로 예상된다. 본 제제의 100 mL는 총 알콜 70 g을 포함한다. 섭취된 양에 따라 환자는 급성알콜중독을 일으킬 수 있다. 알콜중독의 일반적 증상은 오한, 창백한 피부, 구토, 무의식, 느린 호흡(1분당 8번 또는 그 이하의 호흡) 등이다. 이런 경우가 발생하면, 호흡정지로 인한 사망의 가능성이 있으므로 즉각 응급처치를 실시한다.

\* 경구 섭취시 응급처치:

경구섭취 후 수분 내에 즉각 위세척 또는 구도를 일으켜 흡수되지 않은 알콜을 제거한다(의사의 지시에 따라 시행). 위점막을 통한 알콜의 빠른 흡수로 인하여, 경구섭취 후 시간이 많이 경과한 위에는 이러한 방법이 제한적일 수 있다. 심각한 중독이 발생하였을 경우, 기도확보 및 기계적 산소공급을 통한 신속한 산소공급 조치가 필수적이다. 체온이 발생되지 않도록 주의한다. 환자가 안정된 후 정맥을 통한 수분공급, 오심 및 구토에 대한 증상 조절, 저마그네슘증 및 저칼륨증과 같은 전해질 불균형에 대한 조절 등의 조치를 취한다. 혈중 알콜 농도가 위험 수준이거나 생명을 위협하는 상황인 경우, 혈액투석 등의 해독방법을 취할 수 있다.

5) 눈으로의 접촉시:

에탄올과 프로판올은 눈에 매우 자극적이다. 본 제제가 눈에 들어갔다면 환자는 눈에 극심한 통증을 느끼며, 즉각적인 치료를 받지 못하면 눈에 심각한 손상이 발생할 수 있다.

\* 눈으로의 접촉시 응급처치:

이 약이 눈에 들어갔을 경우, 즉각 물로 눈을 씻어 낸다. 수분 동안 충분한 물로 눈 및 눈꺼풀 안쪽을 씻어 낸다. 만약 눈에 대한 자극이 계속된다면, 의사의 지시에 따른다.

### 5. 적용상의 주의

- 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받는다.

### 6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 이 약은 인화성이 있으므로 화기에 가까이 하지 않는다.

**포장단위** : 100ml, 500ml, 1000ml

**저장방법** : 기밀용기, 실온보관

**사용기한** : 제품 유효기간 (일, 월, 연)

예시)01.12.2009 : 2009년 12월 1일

첨부문서 작성(개정)일 : 2013.12.30

사용기한이 경과되었거나 변질, 오손된 의약품은 구입처를 통하여 교환받을 수 있습니다.

**허가사항확인** : <http://drug.mfds.go.kr>

**수입원** : 비브라온코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 440 포스 코센터 서관 13층  
T:02)3459-7800 [www.bbraun.co.kr](http://www.bbraun.co.kr)

**제조원** : (제조의뢰자) B.Braun Melsungen AG,  
Carl-Braun-Strasse 1  
34212 Melsungen, Germany  
(제조사) B.Braun Medical AG, Seesatz 17  
6204 Sempach, Switzerland

**B | BRAUN**

2014-03-13 - 87254